

5가지 성분으로
무좀 각질 가려움을 한 번에!

일반의약품

피엠 트리플크림



사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

● 제품명 : 피엠트리플크림

● 원료약품 및 그 분량 : 1g 중

■ 유효성분 : 테르비나핀염산염(EP)	10mg
우레아(KP)	50mg
크로타미톤(USP)	50mg
L-멘톨(USP)	20mg
에녹솔론(BP)	5mg
■ 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg, 파라옥시벤조산프로필 1mg	
■ 기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 농글리세린, 벤질알코올, 세탄올, 소르비탄모노스테아레이트, 정제수, 카보머940, 트롤아민, 프로필렌글리콜, 폴리소르베이트60	

● 성 상 : 흰색의 크림제

● 효능 · 효과

피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

● 용법 · 용량

1일 1회, 적당량을 환부(질환 부위)에 도포한다(바른다).

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 침), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

경남제약|주

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람
- 3) 악에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 환부(질환 부위)가 인면(얼굴) 또는 광범위한 사람
- 5) 환부(질환 부위)가 화농(곪음)으로 되어 있는 사람
- 6) "습진"인지 "무좀, 완선(시타구니백선), 백선" 인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다)

6. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것

- 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(바듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

- 2) 2주일 정도 사용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

7. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 및 용량을 염수할 것
- 2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것
- 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것
- 5) 이 약은 외용에만 사용할 것
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 악한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다)
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것(품질유지를 위해)

● 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

● 포장단위 : 20g

● 제조자 : (주)퍼슨 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47

● 제조의뢰자 : 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의 하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래 위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 정보는 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 등 검색을 참조 하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.