

PM 쿨 피엠 에어로솔

[제품명] 피엠쿨에어로솔

[원료약품 및 그 분량] 이 약 100g 중

■유효성분 : 테르비나핀염산염(USP).....	0.4g
리도카인(KP).....	0.8g
디펜히드라민(KP).....	0.4g
에녹솔론(BP).....	0.04g
■기타 첨가제 : 디이소프로판올아민, 부틸히드록시톨루엔, 시트르산수화물, 액화석유가스, 에탄올(99.5)	

[성상] 이 약은 무색 내지 미황색(연노랑)의 액체이며 내압용기에 충전(재용)한 에어로솔제이다.

[효능·효과] 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법·용량] 적용 전에 환부(질환부위)를 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨 후 1일 1회 적당량 뿌린다.

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 3) 유·소아 2. 다음 부위에는 사용하지 말 것 (1)눈이나 눈 주위, 점막(예를 들면 구강, 비강, 질 등), 음낭, 외음부 등 (2)습진 (3)습윤(습기 참, 미란(젓무름), 외상(상처)이 심한 환부(질환부위) (4) 손톱, 두피 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것 (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람 (2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람 (3) 약에 의해 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람 (4) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위의 사람 (5) 환부(질환 부위)가 화농(괴음)이 있는 사람 (6) "습진" 또는 "무좀, 완선(사타구니백선(증)), 체부백선"의 구분이 불확실한 사람(가려움증, 염증 등의 증상이 있다면, 다른 원인에 의한 경우도 많다) 4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 (1) 사용 후, 다음의 증상이 나타났을 경우 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 옷, 가려움, 부종(부기), 자극감, 열감, 피부박리(벗겨짐), 미란(젓무름) · 건조, 피부균열(갈라짐) (2) 2주간 정도 사용해도 증상이 나아지지 않거나 본제(이 약)의 사용에 의해 증상이 악화 되었을 경우 5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항 (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 (2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 오염된

경남제약(주)

상태로 사용하지 말 것 (3) 눈에 들어가지 않도록 주의 할 것 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻고 즉시 안과의사의 진료를 받을 것 (4) 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것 (5) 사용 전에 잘 흔들어 줄 것 (6) 환부(질환 부위)까지 5cm의 거리에서 분사, 또한 분무구를 잘 확인하고 안면(얼굴), 특히 눈을 향해 분사하거나 흡입하지 말 것 (7) 동상 등의 우려가 있으므로, 같은 부위에 연속해 1초 이상 분사하지 말 것 **6. 저장상의 주의사항** (1) 직사광선이 닿지 않는 시원한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것 (2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 (3) 본 약이 묻은 손으로 눈이나 점막에 닿지 않도록 할 것 (4) 사용 기한을 넘긴 제품은 사용하지 말 것 (5) 본 약은 합성수지 등을 부드럽게 하거나 페인트를 녹일 수 있기 때문에 가구나 마루 등에 묻지 않게 할 것 (6) 화기에 접근하지 말 것

※ 사용한 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것 ※ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것 ※ 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것 ※ 온도가 40°C 이상 되는 장소에 보관하지 않는다.
 ※ 고압가스를 사용한 가연성 제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것 1) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 2) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것 3) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것 4) 불속에 버리지 말 것 5) 특정 부위에 계속하여 장시간 사용하지 말 것 6) 가능한한 인체에서 20cm 이상 떨어져서 사용할 것

[포장단위] 60g

[저장방법] 기밀용기, 직사광선을 피해 실온(1 ~ 30°C)의 건조한 곳에 보관

[제조사] 신신제약(주) 세종특별자치시 소정면 소정산단도로 9

[제조외리자] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[소비자 상담전화] 080-232-8600, www.kyunghnampharm.com

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 기타 자세한 정보는 의약품통합정보시스템 「<http://nedrug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. (부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223))

사용가스 : 액화석유가스

가연성 | 인체용 (화기주의)